

ከከትባት መርፊዎች በኋላ... ልጅዎ ሕመም ቢሰማው እንደማይደርጉ

እርስዎንና ልጆችዎን በተላላፊ በሽታ ከመያዝ ለመጠበቅ ስለረዱን እናመሰግናለን። መርፊዎቹ (ከትባቶቹ) ትንሽ ያሳምሙ ይሆናል። በበሽታው መያዝ በጣም የባሰ ነው!

ብዙ ሰዎች ከትባት ካደረጉ በኋላ ማሳሰቢያ ሕመም ወይም ትኩሳት ይኖርባቸዋል። ይህ የተለመደ ነው። የእነዚህን ጉዳት የማይሰከትሉ ተቃራኒ ሁኔታዎችን ለመቀነስ የሚረዱ እንዳንድ ሃሳቦች እነሆ።

የማይሰፈልጉዎት ነገሮች:

- አንድ የሰውነት ትኩሳት መላኪያ
- ብዙ ፈሳሽ ለመጠጣት
- ኢቦፕሮፊን ወይም ታይሌናል (ለልጆችዎና ለእርስዎ የሚጠቀሙ የትኛው እንደሆነ እና የመድኃኒቱ አወሳሰድ እንዴት እንደሆነ ፋርማሲስቱን ጠይቁ)። ማንኛውንም ዓይነት አስፈሪን ፈጽሞ ለልጆችዎ እንደማይሰጡ እባክዎ ያስታውሱ። ለሕፃናትና ለልጆች አደገኛ ነው።
- በቀዝቃዛ ወሃ በመንከር በልጅዎ ፊትና ሰውነት ላይ ለማድረግ የማይገልግል አንድ ንፁሕ መታጠቢያ ፎጣ ወይም ቁራጭ ጨቅ

በልጅዎ ላይ የሚሞልኩት ሁኔታ:

- ልጅዎ መቀት ይሰማዋል (እስከ 100.5° ፋ ወይም 38° ሴ)
- ልጅዎ ይቅበጠጣል
- ልጅዎ ከንፈሩ ይደርቃል

ምን እንደማይደርጉ:

- ለልጅዎ የሚጠጣው ብዙ ፈሳሽ ይሰጡ (ወሃ፣ ጌቶሬድ፣ ጭንቄ፣ የጠት ወተት)
- የልጅዎን ልብሶች በከፊል ያወልቁ
- ቀዝቀዝ ባለ (ባማይቀዘቅዝ) ወሃ የተነከረ ንፁሕ መታጠቢያ ጨቅ ይጠቀሙ
- ሕመምን ወይም ትኩሳትን ለማስታገስ የሚረዱ እንዳንድ መድኃኒት ለልጅዎ ይሰጡ። በትኩረት ለማጠን ማሳጠቱን ያረጋግጡ!

እጅግ ጠቃሚ ምክር: የማክተሉት ከታዩ ለሐኪምዎ ይደውሉ ወይም ወደ ሆስፒታል ይሂዱ።

- ኢቦፕሮፊን ወይም ታይሌናል ከተሰጠ ከአንድ ሰዓት በኋላ የልጅዎ ትኩሳት ማጠን ከ100° ፋ ወይም ከ38° ሴ በላይ ከሆነ።
- ልጅዎ ከ3 ሰዓት በላይ የማይሰለቅስና ለቅሶውን የማይቋርጥ ከሆነ።
- ልጅዎ የማይሰነክሰው፣ የማይንቀጠቅጠው ወይም የማይንዘፈዝፈው ከሆነ።

Amharic



After The Shots